1 - Determinare i valori del parametro $\alpha \in \mathbb{R}$ per i quali il limite $\lim_{x \rightarrow 2^+} (x-2)^\alpha \log(x-1)$ è un numero reale diverso da zero.

Posto $y = x - 2$, il limite assegnato diventa

$$\lim_{y \rightarrow 0^+} y^\alpha \log(y+1) = \lim_{y \rightarrow 0^+} y^{\alpha+1} \frac{\log(y+1)}{y},$$

e di conseguenza solo per $\alpha = -1$ tale limite risulta finito e diverso da zero, e vale 1.

2 - Calcolare l'integrale $\int_0^3 \arctan \sqrt{x} \, dx$.

Integrando dapprima per sostituzione con $t = \sqrt{x}$ e successivamente per parti, si ha

$$\begin{aligned} \int_0^3 \arctan \sqrt{x} \, dx &= 2 \int_0^{\sqrt{3}} t \arctan t \, dt = [t^2 \arctan t]_0^{\sqrt{3}} - \int_0^{\sqrt{3}} \frac{t^2}{1+t^2} \, dt \\ &= \pi - \int_0^{\sqrt{3}} \left(1 - \frac{1}{1+t^2}\right) \, dt = \frac{4\pi}{3} - \sqrt{3}. \end{aligned}$$

3 - Determinare il minimo assoluto e il massimo assoluto della funzione $f(x, y) = e^{x^2+y^2} - y^2$ nell'insieme $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq \pi\}$.

La funzione f è continua in D , insieme chiuso e limitato di $\mathbb{R}^2$, e quindi per il teorema di Weierstrass f ha minimo assoluto e massimo assoluto in D .

Il gradiente di f è dato da

$$\nabla f(x, y) = (2xe^{x^2+y^2}, 2y(e^{x^2+y^2} - 1)), \quad (x, y) \in \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 < \pi\},$$

e di conseguenza si annulla solo in $(0, 0)$.

Si deve ora valutare la funzione sulla circonferenza $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = \pi\}$:

$$g(y) = e^\pi - y^2, \quad |y| \leq \sqrt{\pi}.$$

Poiché $g'(y) = -2y$, i punti da prendere in considerazione sono $y = 0$ e $y = \pm\sqrt{\pi}$.

In conclusione, confrontando i valori

$$f(0, 0) = 1, \quad f(\pm\sqrt{\pi}, 0) = e^\pi, \quad f(0, \pm\sqrt{\pi}) = e^\pi - \pi$$

e tenendo anche conto di $e^\pi - \pi > 1$, si ha $\min_{(x,y) \in D} f(x, y) = f(0, 0) = 1$ e $\max_{(x,y) \in D} f(x, y) = f(\pm\sqrt{\pi}, 0) = e^\pi$.

4 - Data la funzione $f(x) = \frac{x^2}{1 + \log x}$ determinare l'insieme di definizione, i limiti agli estremi del dominio, gli intervalli di monotonia, eventuali punti di minimo e di massimo, gli intervalli di convessità, eventuali punti di flesso. Tracciare un grafico qualitativo della funzione.

Dimostrare che $f(x)$ è estendibile per continuità in 0 e che tale estensione risulta anche derivabile a destra in 0.

La funzione $f(x)$ è definita per $x > 0$ e $\log x \neq -1$, cioè $x \neq e^{-1}$.

Per quanto riguarda i limiti agli estremi del dominio si ha

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow \frac{1}{e}^-} f(x) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow \frac{1}{e}^+} f(x) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$$

In particolare, la funzione si può prolungare per continuità in 0 se si pone $f(0) = 0$ e la retta di equazione $x = \frac{1}{e}$ è un asintoto verticale per f .

La derivata prima di $f(x)$ è data da

$$f'(x) = \frac{x(2 \log x + 1)}{(1 + \log x)^2}, \quad x > 0, \quad x \neq e^{-1}.$$

Inoltre

$$\frac{f(x) - f(0)}{x} = \frac{x}{1 + \log x} \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} 0,$$

e quindi f è derivabile a destra in 0 e $f'_+(0) = 0$.

Si osservi che $f'(x) = 0$ per $x = e^{-1/2}$. Dallo studio del segno di f' segue che f è strettamente decrescente in $]0, e^{-1}[$ e in $]e^{-1}, e^{-1/2}[$, mentre è strettamente crescente in $]e^{-1/2}, \infty[$; di conseguenza $x = e^{-1/2}$ è punto di minimo relativo e $f(e^{-1/2}) = \frac{2}{e}$ è il minimo relativo. La derivata seconda di f è data da

$$f''(x) = \frac{2 \log^2 x + \log x + 1}{(1 + \log x)^3}, \quad x > 0, x \neq e^{-1}.$$

Poiché $2 \log^2 x + \log x + 1 > 0$ per ogni $x > 0$, la funzione è concava in $]0, e^{-1}[$, mentre è convessa in $]e^{-1}, \infty[$. Un grafico qualitativo della funzione $f(x)$ è il seguente.