Un metallo a contatto con l'acqua subisce dei cambiamenti superficiali.

L'acqua ha un effetto solo sugli gli atomi superficiali del metallo

► **Alcuni atomi superficiali, in contatto con l'acqua, ionizzano es. $Zn \rightarrow Zn^{2+}_{aq} + 2e^-$**

► **Gli elettroni generati si muovono liberamente nel metallo che avendo elettroni extra, a causa della ionizzazione, diventa più negativo**

► **Gli ioni positivi generati rimangono sulla superficie del metallo che risulta ricoperto da una carica positiva, le cariche negative del metallo si bilanciano esattamente con le cariche positive e gli ioni positivi sono mantenuti sulla superficie del metallo dall'attrazione elettrostatica (adsorbimento)**

► Le molecole di acqua (polari) attraggono gli ioni positivi presenti sulla superficie del metallo, aumentando la ionizzazione

► Nel metallo, gli elettroni e gli ioni si attraggono tra loro e tendono a ricombinarsi, riducendo la ionizzazione

► Se il metallo ha un eccesso di elettroni, la ionizzazione viene ridotta

► Se il metallo ha un difetto di elettroni, la ionizzazione viene aumentata

► Il risultato finale dipende dalla forza delle interazioni elettrostatiche in gioco, che a loro volta dipendono dalla natura del metallo

- ▶ **gli ioni adsorbiti possono staccarsi dalla superficie del metallo (desorbimento) e muoversi nell'acqua**
- ▶ **se ciò accade il metallo perde massa (corrosione)**
- ▶ **i nuovi atomi esposti possono ionizzarsi per rimpiazzare quelli desorbiti, così che la carica negativa della lamina metallica aumenta**
- ▶ **il desorbimento ad un certo punto si ferma, poiché l'aumento di carica negativa si oppone ad esso**
- ▶ **la corrosione si ferma e si raggiunge uno stato di equilibrio**

La quantità di ioni metallici generati al contatto con l'acqua dipende dalla natura del metallo

Schematizzazione del doppio strato

Campo Elettrico 10^8 V/cm

- Capacità del doppio strato $C \approx 1 \mu\text{Fcm}^{-2}$ per
 - d.d.p. di $\approx 1 \text{ Volt}$ (questo è l'ordine di grandezza)
 - La carica Q del condensatore $Q = C V$ (coulomb cm^{-2}) $\approx 10^{-6} \text{ Q cm}^{-2}$
 - 1 mole di elettroni = 96485 Coulomb
- ($10^{-6} \text{ Coulomb} \approx 10^{-11}$ equivalenti $\approx$ un milionesimo di mg)

Il doppio strato elettrochimico (DSE)

Un metallo a contatto con l'acqua si carica negativamente ed è ricoperto da uno strato adsorbito cariche positive sulla superficie

Lo strato adsorbito di ioni positivi attrae gli ioni negativi della soluzione verso il metallo formando uno strato diffusivo mobile

Gli ioni sono liberi di muoversi nello strato diffusivo, possono entrare ed uscire

DSE e Corrente Alternata (CA)

- ▶ Durante il ciclo di salita della CA la corrente fluisce nell'elettrodo (gli elettroni escono)
- ▶ L'elettrodo perde cariche negative e attrae lo strato diffusivo mobile
- ▶ La corrente convenzionale carica il DSE

- ▶ Durante il ciclo di discesa della CA la corrente fluisce dall'elettrodo (gli elettroni entrano)
- ▶ L'elettrodo acquista cariche negative e respinge lo strato diffusivo mobile
- ▶ La corrente convenzionale scarica il DSE

- ▶ una tensione alternata applicata all'elettrodo fa oscillare lo strato diffuso alla frequenza del segnale applicato

DSE e Corrente Continua (CC)

- ☑ La corrente continua generata da un alimentatore CC spinge gli elettroni a muoversi in una sola direzione
- ☑ Un flusso di corrente verso l' elettrodo, rende l' elettrodo sufficientemente positivo da spostare gli ioni adsorbiti nell' elettrolita

- ☑ Altri atomi superficiali vengono ionizzati per rimpiazzare gli ioni desorbiti
- ☑ Gli elettroni generati dalla ionizzazione fluiscono verso l' alimentatore

$$\Delta G < 0$$

Quando $\Delta G = 0$ la pila è scarica

Figura - Schema di funzionamento di una pila elettrica a rame/zinco (J.F. Daniell; ~1820).

Semielementi di I° Specie

Esempi:

Schematizzazione dell'elettrodo

Semielementi di II° Specie

Schematizzazione dell' elettrodo

Me
+
**Sale poco
solubile del Me**

**Soluzione di
elettrolita con
ione a comune
del sale poco
solubile del Me**

Esempi:

**Elettrodo a
calomelano**

**Elettrodo di Arento-
Cloruro di argento**

Semielementi a Gas

Schematizzazione dell' elettrodo

Esempio: elettrodo di Idrogeno

Esempio: elettrodo di Cloro

Esempio: elettrodo di Ossigeno

Semielementi di ossidoriduzione o REDOX

Schematizzazione dell' elettrodo

Esempio:

Esempio:

Semielemento ad amalgama

Schematizzazione dell'elettrodo

Elettrodo simile al semielemento di I° specie, la differenza consiste nell'attività del metallo che nell'amalgama non è unitaria.

Esempio:

Termodinamica del processo elettrochimico

La quantità massima di lavoro ottenibile da un sistema che evolve spontaneamente dallo stato iniziale allo stato finale è ricavabile, quando la trasformazione viene condotta attraverso un'infinita successione di stati d'equilibrio (trasformazione reversibile) come segue:

Dal I° principio della termodinamica per una trasformazione reversibile si ha:

$$\Delta U = Q_{\text{rev}} - L_{\text{rev}}$$

Poiché $\Delta H = \Delta U + P \Delta V$ si ha:

$$\Delta H - P \Delta V = Q_{\text{rev}} - L_{\text{rev}}$$

Dal II° principio della termodinamica $Q_{\text{rev}} = T \Delta S$

$$\Delta H - T \Delta S = -L_{\text{rev}} + P \Delta V$$

$$-\Delta G = L_{\text{utile massimo}}$$

Il lavoro elettrico è un lavoro utile

$$-\Delta G = L_{\text{elettrico}}$$

Il lavoro elettrico è definito come il prodotto di una quantità di carica per una differenza di potenziale (d.d.p.)

1 mol di elettroni = 96485 coulomb = 1 Faraday

$$-\Delta G = nF \Delta E$$

Equazione di Nernst

T = Costante

Per una generica reazione $\mathbf{aA + bB \rightleftharpoons \gamma C + \delta D}$

$$\Delta G_{\text{reazione}} = \sum v_P \cdot \overline{G}_f^o(\text{Prodotti}) - \sum v_R \cdot \overline{G}_f^o(\text{Reagenti})$$

$$\overline{G}_i = \overline{G}_i^o + RT \ln a_i$$

$$\Delta G_{\text{reazione}} = \left(\gamma \overline{G}_C^o + RT \ln a_C^\gamma + \delta \overline{G}_D^o + RT \ln a_D^\delta \right) - \left(\alpha \overline{G}_A^o + RT \ln a_A^\alpha + \beta \overline{G}_B^o + RT \ln a_B^\beta \right)$$

$$\Delta G_{\text{reazione}} = \left[\left(\gamma \overline{G}_C^o + \delta \overline{G}_D^o \right) - \left(\alpha \overline{G}_A^o + \beta \overline{G}_B^o \right) \right] + RT \ln \frac{a_C^\gamma \cdot a_D^\delta}{a_A^\alpha \cdot a_B^\beta}$$

$$\Delta G_{\text{reazione}} = \Delta G_{\text{reazione}}^o + RT \ln \frac{a_C^\gamma \cdot a_D^\delta}{a_A^\alpha \cdot a_B^\beta}$$

Per una reazione di ossidoriduzione, in cui vi è un passaggio di elettroni dalla specie che si ossida a quella che si riduce, la variazione di energia libera può essere messa in relazione con il lavoro elettrico $\Delta G = - nF \Delta E$

$$\Delta G_{\text{reazione}} = \Delta G_{\text{reazione}}^{\circ} + RT \ln \frac{a_{\text{C}}^{\gamma} \cdot a_{\text{D}}^{\delta}}{a_{\text{A}}^{\alpha} \cdot a_{\text{B}}^{\beta}}$$

$$\Delta G = - nF \Delta E$$

$$\Delta E = - \frac{\Delta G^{\circ}}{nF} - \frac{RT}{nF} \ln \frac{a_{\text{C}}^{\gamma} \cdot a_{\text{D}}^{\delta}}{a_{\text{A}}^{\alpha} \cdot a_{\text{B}}^{\beta}}$$

Per una ben precisa reazione di ossidoriduzione, a T=cost, il n° di elettroni, che vengono scambiati sono determinati.

$$- \frac{\Delta G^{\circ}}{nF} = \Delta E^{\circ} \quad \text{Potenziale Standard}$$

$$\Delta E = \Delta E^{\circ} + \frac{RT}{nF} \ln \frac{a_{\text{A}}^{\alpha} \cdot a_{\text{B}}^{\beta}}{a_{\text{C}}^{\gamma} \cdot a_{\text{D}}^{\delta}}$$

Il ΔE in questa equazione è detta forza elettromotrice (f.e.m.) cioè la differenza di potenziale a circuito aperto (OCV)

$R=8.314 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$; $T = 298.15 \text{ K}$; $F = 96485 \text{ Coulomb}$; $\ln = 2.3026 \log$

$$\Delta E = \Delta E^{\circ} + \frac{0.0591}{n} \log \frac{a_{\text{A}}^{\alpha} \cdot a_{\text{B}}^{\beta}}{a_{\text{C}}^{\gamma} \cdot a_{\text{D}}^{\delta}}$$

Equazione di Nernst

$$\Delta E = \Delta E^{\circ} + \frac{0.0591}{n} \log \frac{a_A^{\alpha} \cdot a_B^{\beta}}{a_C^{\gamma} \cdot a_D^{\delta}}$$

Quando $\Delta E = 0$ la reazione è all'equilibrio, in queste condizioni, si ha:

$$-\frac{n \Delta E^{\circ}}{0.0591} = \log \frac{a_A^{\alpha} \cdot a_B^{\beta}}{a_C^{\gamma} \cdot a_D^{\delta}} \quad \text{ovvero} \quad \frac{n \Delta E^{\circ}}{0.0591} = \log \frac{a_C^{\gamma} \cdot a_D^{\delta}}{a_A^{\alpha} \cdot a_B^{\beta}}$$

$$\frac{n \Delta E^{\circ}}{0.0591} = \log K$$

$$K = 10^{\frac{n \Delta E^{\circ}}{0.0591}}$$

Vediamo una reazione reale

$$\Delta E = \Delta E^{\circ} + \frac{0.0591}{n} \log \frac{a_{\text{Cr}^{2+}} \cdot a_{\text{Fe}^{3+}}}{a_{\text{Cr}^{3+}} \cdot a_{\text{Fe}^{2+}}}$$

$$\frac{\Delta E^{\circ}}{0.0591} = \log \frac{a_{\text{Cr}^{3+}} \cdot a_{\text{Fe}^{2+}}}{a_{\text{Cr}^{2+}} \cdot a_{\text{Fe}^{3+}}}$$

Potenziale di un semielemento

Ad ogni equilibrio chimico, in cui sono coinvolti elettroni, può essere applicata l'equazione di Nernst, quindi anche per l'equilibrio presente nel doppio strato elettrodico:

In cui Ox = forma ossidata, Rid = forma ridotta si ha:

$$E = E_{\text{Ox}/\text{Rid}}^{\circ} + \frac{0.0591}{n} \log \frac{a_{\text{Ox}}^{\alpha}}{a_{\text{Rid}}^{\beta}}$$

Esempio: elettrodi di I° specie

$$E = E_{\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}}^{\circ} + \frac{0.0591}{2} \log \frac{a_{\text{Zn}^{2+}}}{a_{\text{Zn}}}$$

L'attività dei solidi e liquidi puri è unitaria $a_{\text{Zn}} = 1$

Esempio: elettrodi di II° specie

<p>Me + Sale poco solubile del Me</p>	<p>Soluzione di elettrolita con ione a comune del sale poco solubile del Me</p>
---	---

$$E = E^o_{\text{AgCl}_{(s)}/\text{Ag}} + \frac{0.0591}{1} \log \frac{a_{\text{AgCl}_{(s)}}}{a_{\text{Ag}} \cdot a_{\text{Cl}^-}}$$

L'attività dei solidi e liquidi puri è unitaria $a_{\text{AgCl}} = 1$; $a_{\text{Ag}} = 1$

Esempio: elettrodi a gas

<p>Elettrodo inerte Pt Gas</p>	<p>Soluzione contenente la specie ossidata o ridotta del gas</p>
---	--

$$E = E^o_{\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2} + \frac{0.0591}{2} \log \frac{a_{\text{H}_3\text{O}^+}^2}{a_{\text{H}_2} \cdot a_{\text{H}_2\text{O}}^2}$$

L'attività di un gas
(considerandolo ideale) = P

Esempio: elettrodi redox

Elettrodo inerte Pt	Soluzione contenente una coppia redox
------------------------	--

$$E = E_{\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}}^{\circ} + \frac{0.0591}{1} \log \frac{a_{\text{Fe}^{3+}}}{a_{\text{Fe}^{2+}}}$$

Altro esempio:

$$E = E_{\text{ClO}_4^-, \text{H}_3\text{O}^+ / \text{ClO}_3^-}^{\circ} + \frac{0.0591}{2} \log \frac{a_{\text{ClO}_4^-} a_{\text{H}_3\text{O}^+}^2}{a_{\text{ClO}_3^-} \cdot a_{\text{H}_2\text{O}}^3}$$

L'attività dei liquidi puri
è unitaria $a_{\text{H}_2\text{O}} = 1$

Esempio: elettro ad amalgama di sodio

	Me^+
Me(Hg)_n	$\text{Hg}_{(l)}$

$$E = E_{\text{Na}^+ / \text{Na}}^{\circ} + \frac{0.0591}{1} \log \frac{a_{\text{Na}^+} \cdot a_{\text{Hg}}^n}{a_{\text{Na(Hg)}_n}}$$

Il potenziale standard E°

Elettrodo di idrogeno standard

$$E = E^\circ_{H_3O^+/H_2} + \frac{0.0591}{2} \log \frac{a_{H_3O^+}^2}{a_{H_2} \cdot a_{H_2O}^2}$$

$$E = E^\circ_{H_3O^+/H_2}$$

Essendo l'argomento del logaritmo = 1

Per convenzione viene attribuito al potenziale di questo elettrodo il valore 0.000 V

In generale si definisce un elettrodo standard quando tutte le specie elettrochimicamente attive si trovano in condizione standard.

Determinazione dei potenziali standard

Si preparano delle pile con due elettrodi standard in cui uno di questi è l'elettrodo di idrogeno standard, per esempio:

si misura sperimentalmente per questa pila una f.e.m. 0.763 V

Se applico agli equilibri elettrodiici l'equazione di Nernst si ottiene:

La f.e.m. della pila deve essere sempre un valore positivo perché sia negativo il ΔG e quindi la reazione spontanea: f.e.m. = $E_{(+)} - E_{(-)}$

Determinazione della polarità della pila:

- Si controlla se c'è sviluppo di gas**
- se c'è consumo o aumento della massa di un elettrodo**
- si controlla il verso della corrente**
- quando sono noti gli E° si applica l'equazione di Nernst e si calcolano direttamente i potenziali.**

Nel nostro caso se si immerge dello zinco in acido si osserva uno sviluppo spontaneo di gas e la massa dello zinco diminuisce questo significa che lo Zn si ossida e l' H_3O^+ si riduce.

$$\mathbf{f.e.m. = E_{(+)} - E_{(-)} = E_{(s)} - E_{(d)}}$$

$$\mathbf{0.000 - E_{(d)} = 0.763}$$

$$\mathbf{E_{d} = E_{Zn^{2+}/Zn}^\circ = - 0.763 V}$$

Tabella — Potenziali standard di semielementi in soluzione acquosa e a 25 °C, riferiti all'elettrodo standard di idrogeno (SHE; nota 25).

Semireazione	E_0 (V)	Semireazione	E_0 (V)
$Li^+ + e \rightleftharpoons Li$	-3,040	$S_4O_6^{2-} + 2e \rightleftharpoons 2S_2O_3^{2-}$	0,081
$K^+ + e \rightleftharpoons K$	-2,931	$S + 2H_3O^+ + 2e \rightleftharpoons H_2S + 2H_2O$	0,142
$Ca^{2+} + 2e \rightleftharpoons Ca$	-2,868	$Sn^{4+} + 2e \rightleftharpoons Sn^{2+}$ (HCl 1F)	0,151
$Na^+ + e \rightleftharpoons Na$	-2,7109	$Cu^{+2} + e \rightleftharpoons Cu^+$	0,153
$Mg^{2+} + 2e \rightleftharpoons Mg$	-2,372	$Hg_2Cl_2 + 2e \rightleftharpoons 2Hg + 2Cl^-$	0,2681
$H_3O^+ + e \rightleftharpoons H_2O + H$	-2,10	$Cu^{2+} + 2e \rightleftharpoons Cu$	0,342
$Al^{3+} + 3e \rightleftharpoons Al$	-1,662	$O_2 + 2H_2O + 4e \rightleftharpoons 4OH^-$	0,401
$Ti^{2+} + 2e \rightleftharpoons Ti$	-1,630	$Cu^+ + e \rightleftharpoons Cu$	0,521
$ZnO_2^{2-} + 2H_2O + 2e \rightleftharpoons Zn + 4OH^-$	-1,215	$I_2 + 2e \rightleftharpoons 2I^-$	0,535
$Mn^{2+} + 2e \rightleftharpoons Mn$	-1,185	$O_2 + 2H_3O^+ + 2e \rightleftharpoons H_2O_2 + 2H_2O$	0,682
$Cr^{2+} + 2e \rightleftharpoons Cr$	-0,913	$Fe^{3+} + e \rightleftharpoons Fe^{2+}$	0,771
$2H_2O + 2e \rightleftharpoons H_2 + 2OH^-$	-0,8277	$Hg_2^{2+} + 2e \rightleftharpoons 2Hg$	0,7973
$Te + 2H_3O^+ + 2e \rightleftharpoons H_2Te + 2H_2O$	-0,783	$Ag^+ + e \rightleftharpoons Ag$	0,7996
$Zn^{2+} + 2e \rightleftharpoons Zn$	-0,7618	$2NO_3^- + 4H_3O^+ + 2e \rightleftharpoons N_2O_4 + 6H_2O$	0,803
$Cr^{3+} + 3e \rightleftharpoons Cr$	-0,744	$NO_3^- + 3H_3O^+ + 2e \rightleftharpoons HNO_2 + 4H_2O$	0,934
$As + 3H_3O^+ + 3e \rightleftharpoons AsH_3 + 3H_2O$	-0,608	$NO_3^- + 4H_3O^+ + 3e \rightleftharpoons NO + 6H_2O$	0,957
$H_3PO_2 + H_3O^+ + e \rightleftharpoons P + 3H_2O$	-0,508	$Br_{2(l)} + 2e \rightleftharpoons 2Br^-$	1,065
$Fe^{2+} + 2e \rightleftharpoons Fe$	-0,447	$Pt^{2+} + 2e \rightleftharpoons Pt$	1,118
$Cr^{3+} + e \rightleftharpoons Cr^{2+}$	-0,407	$MnO_2 + 4H_3O^+ + 2e \rightleftharpoons Mn^{2+} + 6H_2O$	1,224
$Cd^{2+} + 2e \rightleftharpoons Cd$	-0,403	$O_2 + 4H_3O^+ + 4e \rightleftharpoons 6H_2O$	1,229
$Se + 2H_3O^+ + 2e \rightleftharpoons H_2Se + 2H_2O$	-0,400	$Cr_2O_7^{2-} + 14H_3O^+ + 6e \rightleftharpoons 2Cr^{3+} + 21H_2O$	1,232
$Tl^+ + e \rightleftharpoons Tl$	-0,336	$Cl_2 + 2e \rightleftharpoons 2Cl^-$	1,358
$Co^{2+} + 2e \rightleftharpoons Co$	-0,277	$ClO_3^- + 6H_3O^+ + 6e \rightleftharpoons Cl^- + 9H_2O$	1,451
$Ni^{2+} + 2e \rightleftharpoons Ni$	-0,257	$PbO_2 + 4H_3O^+ + 2e \rightleftharpoons Pb^{2+} + 6H_2O$	1,455
$Mo^{3+} + 3e \rightleftharpoons Mo$	-0,200	$MnO_4^- + 8H_3O^+ + 5e \rightleftharpoons Mn^{2+} + 12H_2O$	1,507
$Sn^{2+} + 2e \rightleftharpoons Sn$	-0,1374	$HClO + H_3O^+ + e \rightleftharpoons \frac{1}{2}Cl_2 + 2H_2O$	1,611
$Pb^{2+} + 2e \rightleftharpoons Pb$	-0,1263	$H_2O_2 + 2H_3O^+ + 2e \rightleftharpoons 4H_2O$	1,776
$2H_3O^+ + 2e \rightleftharpoons H_2 + 2H_2O$	0	$Co^{3+} + e \rightleftharpoons Co^{2+}$ (H ₂ SO ₄ 2F)	1,83
$NO_3^- + H_2O + 2e \rightleftharpoons NO_2^- + 2OH^-$	0,01	$F_2 + 2e \rightleftharpoons 2F^-$	2,866

Tabella dei potenziali standard di semielementi (25°C) rispetto al SHE

$\text{Li}^+ + e^- \rightleftharpoons \text{Li}$	-3,045	$\text{CuBr} + e^- \rightleftharpoons \text{Cu} + \text{Br}^-$	+0,033	$\text{SeO}_4^{2-} + 4\text{H}_3\text{O}^+ + 2e^- \rightleftharpoons$	
$\text{K}^+ + e^- \rightleftharpoons \text{K}$	-2,925	$\text{S}_4\text{O}_6^{2-} + 2e^- \rightleftharpoons 2\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$	+0,08	$\rightleftharpoons \text{H}_2\text{SeO}_3 + 5\text{H}_2\text{O}$	+1,15
$\text{Rb}^+ + e^- \rightleftharpoons \text{Rb}$	-2,925	$\text{CuCl} + e^- \rightleftharpoons \text{Cu} + \text{Cl}^-$	+0,137	$\text{IO}_3^- + 6\text{H}_3\text{O}^+ + 5e^- \rightleftharpoons$	
$\text{Cs}^+ + e^- \rightleftharpoons \text{Cs}$	-2,923	$\text{Sn}^{4+} + 2e^- \rightleftharpoons \text{Sn}^{2+}$	+0,15	$\rightleftharpoons 1/2\text{I}_2 + 9\text{H}_2\text{O}$	+1,195
$\text{Ba}^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons \text{Ba}$	-2,90	$\text{Cu}^{2+} + e^- \rightleftharpoons \text{Cu}^+$	+0,153	$\text{O}_2 + 4\text{H}_3\text{O}^+ + 4e^- \rightleftharpoons 6\text{H}_2\text{O}$	+1,229
$\text{Sr}^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons \text{Sr}$	-2,89	$\text{SO}_4^{2-} + 4\text{H}_3\text{O}^+ + 2e^- \rightleftharpoons$		$\text{TI}^{3+} + 2e^- \rightleftharpoons \text{TI}^+$	+1,25
$\text{Ca}^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons \text{Ca}$	-2,87	$\rightleftharpoons \text{H}_2\text{SO}_3 + 5\text{H}_2\text{O}$	+0,17	$\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 14\text{H}_3\text{O}^+ + 6e^- \rightleftharpoons$	
$\text{Na}^+ + e^- \rightleftharpoons \text{Na}$	-2,714	$\text{AgCl} + e^- \rightleftharpoons \text{Ag} + \text{Cl}^-$	+0,222	$\rightleftharpoons 2\text{Cr}^{3+} + 21\text{H}_2\text{O}$	+1,33
$\text{Mg}^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons \text{Mg}$	-2,37	$\text{Hg}_2\text{Cl}_2 + 2e^- \rightleftharpoons 2\text{Hg} + 2\text{Cl}^-$	+0,2681	$\text{Cl}_2 + 2e^- \rightleftharpoons 2\text{Cl}^-$	+1,3595
$\text{Lu}^{3+} + 3e^- \rightleftharpoons \text{Lu}$	-2,25	$\text{Cu}^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons \text{Cu}$	+0,337	$\text{Au}^{3+} + 3e^- \rightleftharpoons \text{Au}$	+1,50
$1/2\text{H}_2 + e^- \rightleftharpoons \text{H}^-$	-2,25	$[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-} + e^- \rightleftharpoons$		$\text{Mn}^{3+} + e^- \rightleftharpoons \text{Mn}^{2+}$	+1,51
$\text{Sc}^{3+} + 3e^- \rightleftharpoons \text{Sc}$	-2,08	$\rightleftharpoons [\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$	+0,36	$\text{MnO}_4^- + 8\text{H}_3\text{O}^+ + 5e^- \rightleftharpoons$	
$\text{Be}^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons \text{Be}$	-1,85	$2\text{H}_2\text{SO}_3 + 2\text{H}_3\text{O}^+ + 2e^- \rightleftharpoons$		$\rightleftharpoons \text{Mn}^{2+} + 12\text{H}_2\text{O}$	+1,51
$\text{Al}^{3+} + 3e^- \rightleftharpoons \text{Al}$	-1,66	$\rightleftharpoons \text{S}_2\text{O}_3^{2-} + 5\text{H}_2\text{O}$	+0,40	$\text{BrO}_3^- + 6\text{H}_3\text{O}^+ + 5e^- \rightleftharpoons$	
$\text{Ti}^{3+} + 2e^- \rightleftharpoons \text{Ti}$	-1,63	$1/2\text{O}_2 + \text{H}_2\text{O} + 2e^- \rightleftharpoons 2\text{OH}^-$	+0,401	$\rightleftharpoons 1/2\text{Br}_2 + 9\text{H}_2\text{O}$	+1,52
$\text{Mn}^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons \text{Mn}$	-1,18	$4\text{H}_2\text{SO}_3 + 4\text{H}_3\text{O}^+ + 6e^- \rightleftharpoons$		$\text{Ce}^{4+} + e^- \rightleftharpoons \text{Ce}^{3+}$	+1,61
$\text{V}^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons \text{V}$	$\approx -1,18$	$\rightleftharpoons \text{S}_4\text{O}_6^{2-} + 10\text{H}_2\text{O}$	+0,51	$\text{Au}^+ + e^- \rightleftharpoons \text{Au}$	$\approx +1,68$
$\text{Zn}^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons \text{Zn}$	-0,763	$\text{Cu}^+ + e^- \rightleftharpoons \text{Cu}$	+0,521	$\text{MnO}_4^- + 2\text{H}_2\text{O} + 3e^- \rightleftharpoons$	
$\text{Cr}^{3+} + 3e^- \rightleftharpoons \text{Cr}$	-0,74	$\text{I}_2 + 2e^- \rightleftharpoons 2\text{I}^-$	+0,5355	$\rightleftharpoons \text{MnO}_2 + 4\text{OH}^-$	+1,695
$\text{Ga}^{3+} + 3e^- \rightleftharpoons \text{Ga}$	-0,53	$\text{Cu}^{2+} + \text{Cl}^- + e^- \rightleftharpoons \text{CuCl}$	+0,538	$\text{H}_2\text{O}_2 + 2\text{H}_3\text{O}^+ + 2e^- \rightleftharpoons 4\text{H}_2\text{O}$	+1,77
$\text{H}_3\text{PO}_3 + 2\text{H}_3\text{O}^+ + 2e^- \rightleftharpoons$		$\text{H}_3\text{AsO}_4 + 2\text{H}_3\text{O}^+ + 2e^- \rightleftharpoons$		$\text{Co}^{3+} + e^- \rightleftharpoons \text{Co}^{2+}$	+1,82
$\rightleftharpoons \text{H}_3\text{PO}_3 + 3\text{H}_2\text{O}$	-0,50	$\rightleftharpoons \text{HAsO}_2 + 4\text{H}_2\text{O}$	+0,559	$\text{Ag}^{2+} + e^- \rightleftharpoons \text{Ag}^+$	+1,98
$\text{Fe}^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons \text{Fe}$	-0,440	$\text{MnO}_4^- + e^- \rightleftharpoons \text{MnO}_4^{2-}$	+0,564	$\text{S}_2\text{O}_8^{2-} + 2e^- \rightleftharpoons 2\text{SO}_4^{2-}$	+2,01
$\text{Cr}^{3+} + e^- \rightleftharpoons \text{Cr}^{2+}$	-0,41	$\text{Cu}^{2+} + \text{Br}^- + e^- \rightleftharpoons \text{CuBr}$	+0,64	$\text{F}_2 + 2e^- \rightleftharpoons 2\text{F}^-$	+2,87
$\text{Cd}^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons \text{Cd}$	-0,403	$\text{O}_2 + 2\text{H}_3\text{O}^+ + 2e^- \rightleftharpoons$			
$\text{Ti}^{3+} + e^- \rightleftharpoons \text{Ti}^{2+}$	$\approx -0,37$	$\rightleftharpoons \text{H}_2\text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$	+0,682		
$\text{In}^{3+} + 3e^- \rightleftharpoons \text{In}$	-0,342	$\text{Fe}^{3+} + e^- \rightleftharpoons \text{Fe}^{2+}$	+0,771		
$\text{TI}^+ + e^- \rightleftharpoons \text{TI}$	-0,3363	$\text{Hg}_2^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons 2\text{Hg}$	+0,789		
$\text{Co}^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons \text{Co}$	-0,277	$\text{Ag}^+ + e^- \rightleftharpoons \text{Ag}$	+0,7991		
$\text{H}_3\text{PO}_4 + 2\text{H}_3\text{O}^+ + 2e^- \rightleftharpoons$		$\text{Cu}^{2+} + \text{I}^- + e^- \rightleftharpoons \text{CuI}$	+0,86		
$\rightleftharpoons \text{H}_3\text{PO}_3 + 3\text{H}_2\text{O}$	-0,276	$2\text{Hg}^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons \text{Hg}_2^{2+}$	+0,920		
$\text{V}^{3+} + e^- \rightleftharpoons \text{V}^{2+}$	-0,255	$\text{NO}_3^- + 3\text{H}_3\text{O}^+ + 2e^- \rightleftharpoons$			
$\text{Ni}^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons \text{Ni}$	-0,250	$\rightleftharpoons \text{HNO}_2 + 4\text{H}_2\text{O}$	+0,94		
$\text{CuI} + e^- \rightleftharpoons \text{Cu} + \text{I}^-$	-0,185	$\text{NO}_3^- + 4\text{H}_3\text{O}^+ + 3e^- \rightleftharpoons$			
$\text{AgI} + e^- \rightleftharpoons \text{Ag} + \text{I}^-$	-0,151	$\rightleftharpoons \text{NO} + 6\text{H}_2\text{O}$	+0,96		
$\text{Sn}^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons \text{Sn}$	-0,136	$\text{Br}_2(l) + 2e^- \rightleftharpoons 2\text{Br}^-$	+1,0652		
$\text{Pb}^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons \text{Pb}$	-0,126				
$2\text{H}^+ + 2e^- \rightleftharpoons \text{H}_2$	0,00				

Diagrammi Potenziale pH (diagrammi di Pourbaix)

$$E = E_{\text{H}^+/\text{H}_2}^o + \frac{RT}{2F} \ln \frac{a_{\text{H}_3\text{O}^+}^2}{a_{\text{H}_2} \cdot a_{\text{H}_2\text{O}}} = E_{\text{H}^+/\text{H}_2}^o + \frac{RT}{F} \ln a_{\text{H}_3\text{O}^+} - \frac{RT}{2F} \ln P_{\text{H}_2}$$

$$E = E_{\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}}^o + \frac{RT}{4F} \ln \frac{a_{\text{O}_2} \cdot a_{\text{H}_3\text{O}^+}^4}{a_{\text{H}_2\text{O}}^6} = E_{\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}}^o + \frac{RT}{F} \ln a_{\text{H}_3\text{O}^+} + \frac{RT}{4F} \ln P_{\text{O}_2}$$

Diagramma di Pourbaix dell' acqua ossigenata H₂O₂

$$E = E_{\text{H}_2\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}}^{\circ} + \frac{RT}{2F} \ln \frac{a_{\text{H}_2\text{O}_2} \cdot a_{\text{H}_3\text{O}^+}^2}{a_{\text{H}_2\text{O}}^4} = E_{\text{H}_2\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}}^{\circ} + \frac{RT}{F} \ln a_{\text{H}_3\text{O}^+} + \frac{RT}{2F} \ln \frac{a_{\text{H}_2\text{O}_2}}{a_{\text{H}_2\text{O}}^4}$$

$$E_{\text{H}_2\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}}^{\circ} = 1.776\text{V}$$

Reazione di disproportionazione
 Sch. Riduz. $\text{H}_2\text{O}_2 + 2\text{e}^- + 2\text{H}_3\text{O}^+ \leftrightarrow 4\text{H}_2\text{O}$
 Sch. Oss. $\text{H}_2\text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} \leftrightarrow \text{O}_2 + 2\text{e}^- + 2\text{H}_3\text{O}^+$
 Reazione totale: $2\text{H}_2\text{O}_2 \leftrightarrow 2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2$

$$E_{\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}_2}^{\circ} = 0.682\text{V}$$

$$E = E_{\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}_2}^{\circ} + \frac{RT}{2F} \ln \frac{a_{\text{O}_2} \cdot a_{\text{H}_3\text{O}^+}^2}{a_{\text{H}_2\text{O}_2} \cdot a_{\text{H}_2\text{O}}^2} = E_{\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}_2}^{\circ} + \frac{RT}{F} \ln a_{\text{H}_3\text{O}^+} + \frac{RT}{2F} \ln p_{\text{O}_2} - \frac{RT}{2F} \ln a_{\text{H}_2\text{O}_2}$$

Diagramma di Pourbaix semplificato del sistema Br₂/H₂O a 25 °C

$$E = E_{\text{BrO}_3^- / \text{Br}^-}^o + \frac{RT}{6F} \ln \frac{a_{\text{BrO}_3^-} \cdot a_{\text{H}^+}^6}{a_{\text{Br}^-} \cdot a_{\text{H}_2\text{O}}^3} = E_{\text{BrO}_3^- / \text{Br}^-}^o + \frac{RT}{F} \ln a_{\text{H}^+} + \frac{RT}{6F} \ln \frac{a_{\text{BrO}_3^-}}{a_{\text{Br}^-}}$$

Linea b

$$E = E_{\text{Br}_2 / \text{Br}^-}^o + \frac{RT}{2F} \ln \frac{a_{\text{Br}_2}}{a_{\text{Br}^-}^2} = 1.08 + \frac{RT}{2F} \ln \frac{a_{\text{Br}_2}}{a_{\text{Br}^-}^2}$$

Linea c

$$E = E_{\text{BrO}_3^- / \text{Br}_2}^o + \frac{RT}{10F} \ln \frac{a_{\text{BrO}_3^-}^2 \cdot a_{\text{H}^+}^{12}}{a_{\text{Br}_2} \cdot a_{\text{H}_2\text{O}}^6} = E_{\text{BrO}_3^- / \text{Br}_2}^o + \frac{RT}{F} 1.2 \ln a_{\text{H}^+} + \frac{RT}{10F} \ln \frac{a_{\text{BrO}_3^-}^2}{a_{\text{Br}_2} \cdot a_{\text{H}_2\text{O}}^6}$$

Diagramma di Pourbaix semplificato del sistema Cd/H₂O a 25 °C

Consideriamo ora il caso in cui l'acqua sia coinvolta nella chimica del semielemento galvanico tramite specie che comportano equilibri di idrolisi; in particolare il caso del cadmio per il quale possiamo avere tre fasi: Cd metallico, la soluzione di Cd²⁺ e l'ossido idrato di Cd.

► Si ha un equilibrio di idrolisi, puramente chimico:

► E due possibili equilibri elettrodici:

$$E = E_{\text{Cd}^{2+}/\text{Cd}}^{\circ} + \frac{RT}{2F} \ln a_{\text{Cd}^{2+}}$$

$$E = E_{\text{Cd}(\text{OH})_{2(s)}/\text{Cd}}^{\circ} + \frac{RT}{F} \ln \frac{a_{\text{H}^+}}{a_{\text{H}_2\text{O}}}$$

Diagramma potenziale-pH, semplificato, per il sistema Cd/H₂O con $a_{\text{Cd}^{2+}} = 1$, a 25 °C.

Diagramma di Pourbaix semplificato nel caso di un metallo anfotero, per esempio l'alluminio

$$E = E^o_{\text{Al}^{3+} / \text{Al}} + \frac{RT}{3F} \ln a_{\text{Al}^{3+}}$$

Per pH superiori al valore d' idrolisi

$$E = E^o_{\text{Al}_2\text{O}_3 / \text{Al}} + \frac{RT}{F} \ln a_{\text{H}^+}$$

Per pH superiori al valore di solubilizzazione dell' ossido

$$E = E^o_{\text{AlO}_2^- / \text{Al}} + \frac{4RT}{3F} \ln a_{\text{H}^+}$$

Diagramma potenziale-pH, semplificato, per il sistema Al/H₂O, con attività unitaria per ciascuna delle speci in soluzione. Temperatura: 25 °C.

Le due linee verticali rappresentano gli equilibri degli ioni Al³⁺ e alluminato AlO₂⁻

Diagramma di Pourbaix semplificato del piombo con formazione degli ossidi di diversa valenza

Diagramma potenziale-pH, semplificato, per il sistema Pb/H₂O a 25 °C, con $a = 0,0001$ per ciascuna delle speci in soluzione.

Nel caso fosse presente un anione che forma un sale poco solubile (per esempio lo ione SO_4^{2-} nel caso del piombo)

a basso pH rappresenta la termodinamica dell' accumulatore al piombo

$$E = 1,638 - 0,0886 \text{ pH} + 0,0295 \log a_{\text{HSO}_4^-} ;$$

$$E = 1,712 - 0,1182 \text{ pH} + 0,0295 \log a_{\text{SO}_4^{2-}} ;$$

$$E = -0,300 - 0,0295 \text{ pH} - 0,0295 \log a_{\text{HSO}_4^-} ;$$

$$E = -0,356 - 0,0295 \log a_{\text{SO}_4^{2-}} ;$$

Diagramma potenziale-pH, semplificato, per il sistema $\text{Pb}/\text{H}_2\text{O}/\text{H}_2\text{SO}_4$ a $25\text{ }^\circ\text{C}$, con la condizione che l'attività totale di HSO_4^- più SO_4^{2-} sia uguale ad 1 mole/litro.

FIG. 1. Potential-pH equilibrium diagram for the system nickel-water, at 25°C.

FIG. 2. Potential-pH equilibrium diagram for the system copper-water, at 25°C. [Considering the solid substances Cu, Cu₂O and Cu(OH)₂. CuO is not considered.]

FIG. 1. Potential-pH equilibrium diagram for the system manganese-water, at 25°C.
[Considering β -MnO₂ (pyrolusite).]

Elettrodi di riferimento