

SOLUZIONI COMPITO INTEGRATIVO

Esercizio 1

L'equazione differenziale proposta è un'equazione lineare del secondo ordine a coefficienti costanti, la cui equazione caratteristica associata è

$$5\lambda^2 + 2\lambda + 1 = 0.$$

Essa ha come soluzioni $\lambda = \frac{-1 \pm 2i}{5}$, pertanto l'integrale generale dell'omogenea associata è dato da

$$y_0(x) = e^{-x/5} [C_1 \cos(2x/5) + C_2 \sin(2x/5)].$$

Dal metodo di somiglianza si ricava anche che una soluzione particolare è data da $y_p(x) = e^x/8$, quindi l'integrale generale dell'equazione proposta sarà

$$y(x) = e^{-x/5} [C_1 \cos(2x/5) + C_2 \sin(2x/5)] + \frac{1}{8}e^x.$$

Imponendo, infine, le condizioni iniziali, si ricava

$$y(x) = -\frac{5}{16}e^{-x/5} \sin(2x/5) + \frac{1}{8}e^x.$$

Esercizio 2

All'interno dell'insieme D , poiché la funzione è regolare, procediamo cercando i punti stazionari, cioè i punti che annullano il gradiente:

$$\begin{cases} f_x(x, y) = 6x^2 - 2y = 0 \\ f_y(x, y) = -2x + 1 = 0, \end{cases} \implies (x, y) = (1/2, 3/4) \notin D.$$

Pertanto, non ci sono punti estremanti all'interno di D . Poiché f è continua e l'insieme D è chiuso e limitato, per il Teorema di Weierstrass la funzione ammette almeno un punto di massimo ed un punto di minimo assoluto in D . Poiché all'interno di D , come appena visto, non vi sono estremanti, essi saranno necessariamente sulla frontiera. Per determinarli, studiamo la restrizione di f alla frontiera di D .

- lato $a := \{x = 0, y \in [0, 1]\}$:

$$f(0, y) = y =: g_1(y) \quad \text{da cui} \quad g_1'(y) = 1 > 0;$$

quindi la funzione è crescente quando $y \in [0, 1]$. Pertanto $(0, 0)$ è punto di minimo per f vincolato al lato a , mentre $(0, 1)$ è punto di massimo per f vincolato al lato a .

- lato $b := \{y = 0, x \in [0, 1]\}$:

$$f(x, 0) = 2x^3 =: g_2(x) \quad \text{da cui} \quad g_2'(x) = 6x^2 \geq 0;$$

quindi la funzione è crescente quando $x \in [0, 1]$. Pertanto $(0, 0)$ è punto di minimo per f vincolato al lato b , mentre $(1, 0)$ è punto di massimo per f vincolato al lato b .

- lato $c := \{y = (x - 1)^2, x \in [0, 1]\}$:

$$f(x, (x - 1)^2) = 5x^2 - 4x + 1 =: g_3(x) \quad \text{da cui} \quad g_3'(x) = 10x - 4;$$

quindi la funzione è decrescente quando $x \in [0, 2/5]$ e crescente quando $x \in (2/5, 1]$. Pertanto $(0, 1)$ e $(1, 0)$ sono punti di massimo per f vincolati al lato c , mentre $(2/5, 9/25)$ è punto di minimo per f vincolato al lato c .

Poiché

$$\begin{cases} f(0, 1) = 1 \\ f(1, 0) = 2 \end{cases} \quad \text{e} \quad \begin{cases} f(0, 0) = 0 \\ f(2/5, 9/25) = 1/5 \end{cases}$$

si ricava subito che $(0, 0)$ è punto di minimo assoluto per f su D , mentre $(1, 0)$ è punto di massimo assoluto per f su D .

Esercizio 3

Poiché la funzione proposta è non negativa e continua nell'intervallo $(0, +\infty)$, studiando il suo comportamento per $x \rightarrow 0^+$ e per $x \rightarrow +\infty$ otteniamo

per $x \rightarrow 0^+$ $f(x) \sim \frac{x^2}{x^{5/2}} = \frac{1}{\sqrt{x}}$ che è impropriamente integrabile;

per $x \rightarrow +\infty$ $f(x) \leq \frac{\log(1+x)}{\sqrt{x^5 \cdot 2x}} = \frac{\log(1+x)}{\sqrt{2}x^3}$ che è impropriamente integrabile.

Pertanto la funzione proposta risulta impropriamente integrabile in $(0, +\infty)$.

Esercizio 4

Considerando la funzione ristretta all'asse x e all'asse y , rispettivamente, si ottiene

$$\lim_{y \rightarrow 0} f(0, y) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{0}{y^4} = 0 \qquad \lim_{x \rightarrow 0} f(x, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^2}{x^2} = 2$$

pertanto il limite proposto non esiste.