

Nome, Cognome e Matricola

Esercizi Settimanali di Geometria 1
Settimana 6
Docenti: Giovanni Cerulli Irelli,
Marco Trevisiol

Da consegnare Martedì 10 Novembre 2020

Esercizio 1. *Trovare la forma a scala ridotta di ognuna delle seguenti matrici e trovare le loro colonne dominanti. Verificare il risultato con MATLAB.*

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 & 0 & 3 \\ 1 & -1 & 0 & 2 & -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$C = \begin{pmatrix} -3 & 3 & -6 & -2 & -4 & 5 & 3 & 8 \\ -2 & 2 & -4 & -3 & -1 & 0 & -2 & -2 \\ -3 & 3 & -6 & 1 & -7 & 11 & 0 & 11 \\ -2 & 2 & -4 & 3 & -7 & 12 & -1 & 11 \end{pmatrix}$$

05 Novembre 2020

Nome, Cognome e Matricola

Esercizio 2. 1. *Descrivere tutte le possibili matrici 2×2 a scala ridotte.*

2. *Data una matrice $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \text{Mat}_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ nei parametri reali a, b, c, d , trovare la sua forma a scala ridotta. (Ovviamente $\text{rref}(A)$ dipende dalla scelta dei parametri, per cui bisogna considerare i diversi casi separatamente.)*

05 Novembre 2020

Nome, Cognome e Matricola

Esercizio 3. Calcolare l'inversa delle seguenti matrici, e verificare il risultato con MATLAB:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1+i & i \\ 1 & -i & -i \\ -i & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 1 & 0 \\ 2 & -3 & 0 & 2 \\ -2 & -1 & 0 & 2 \\ -1 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

05 Novembre 2020

Nome, Cognome e Matricola

Esercizio 4. Sia V uno spazio vettoriale di dimensione 3 e sia $\mathcal{B} = \{v_1, v_2, v_3\}$ una base di V . Sia $f : V \rightarrow V$ l'unica applicazione lineare tale che

$$f(v_1) = v_1 + 2v_2 + v_3, \quad f(v_2) = v_1 + v_3, \quad f(v_3) = v_1 + v_2 + v_3.$$

1. Scrivere la matrice che rappresenta f nella base \mathcal{B} . Denotarla con A .
2. Trovare una base per il nucleo di f .
3. Trovare una base per l'immagine di f .
4. Sia $\mathcal{C} = \{w_1, w_2, w_3\}$ dove

$$w_1 = v_1 + 2v_2, \quad w_2 = -v_1 - v_2, \quad w_3 = v_1 + v_2 + v_3.$$

Dimostrare che \mathcal{C} è una base di V .

5. Scrivere la matrice che rappresenta f nella base \mathcal{C} .

05 Novembre 2020

Nome, Cognome e Matricola

Esercizio 5. Sia $V = \mathbb{R}[x]_{\leq 3}$. Consideriamo le seguenti funzioni

$$F : V \rightarrow \mathbb{R}^4 : F(p(x)) = \begin{pmatrix} p(-2) \\ p(-1) \\ p(1) \\ p(2) \end{pmatrix}$$

$$L : V \rightarrow V : L(p(x)) = p(x+1) + p(x-1)$$

1. Dimostrare che F ed L sono lineari.
2. Trovare la base \mathcal{B} tale che $F = F_{\mathcal{B}}$.
3. Trovare la matrice associata ad L nella base \mathcal{B} (sia in partenza che in arrivo).
4. Trovare la matrice associata ad L nella base standard (sia in partenza che in arrivo).
5. Mostrare che L è invertibile e calcolare l'inversa della matrice del punto precedente.

05 Novembre 2020

Nome, Cognome e Matricola
